

## Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

### Mupina, 20 mg/g, maść do nosa mupirocyna

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

#### Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Mupina i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mupina
3. Jak stosować lek Mupina
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Mupina
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### 1. Co to jest lek Mupina i w jakim celu się go stosuje

Lek Mupina, 20 mg/g, maść do nosa (nazywany „Mupina” w tej ulotce) zawiera substancję czynną - mupirocynę wapniową. Lek Mupina jest maścią do nosa zawierającą antybiotyki.

Lek ten jest stosowany:

- do zwalczania w nosie bakterii z grupy zwanej gronkowcami.
- do tej grupy należy MRSA (oporny na metycylinę szczep *Staphylococcus aureus*).
- ta maść jest przeznaczona wyłącznie do stosowania do nosa.

#### 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mupina

##### Kiedy nie stosować leku Mupina:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mupirocynę wapniową, mupirocynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Nie wolno stosować leku Mupina u niemowląt, aby uniknąć przedostania się do górnych dróg oddechowych i zachłyśnięcia.

W razie wątpliwości, czy nie dotyczy to pacjenta, nie należy stosować tego leku. Przed rozpoczęciem stosowania leku Mupina, należy omówić to z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

##### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mupina należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Mupina może spowodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych i alergii. Patrz „Stany, na które należy zwrócić uwagę” w punkcie 4.

Zakażenia organizmami niewrażliwymi mogą się rozwijać, jeśli lek Mupina jest używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy o tym powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Należy unikać kontaktu maści z oczami.

- Jeśli maść dostanie się przypadkowo do oczu, należy dokładnie przemyć je wodą.

### **Lek Mupina a inne leki**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Mało prawdopodobne jest, aby lek Mupina wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

## **3. Jak stosować lek Mupina**

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **Dawkowanie**

*Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej jednego roku:*

Lek Mupina należy wprowadzać do nosa dwa do trzech razy na dobę.

*Dzieci w wieku poniżej jednego roku:*

Leku Mupina nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej jednego roku.

*Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:*

Nie jest konieczne dostosowanie dawki.

*Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:*

Nie jest konieczne dostosowanie dawki.

### **Stosowanie tego leku**

Lek Mupina należy wprowadzać do nosa dwa do trzech razy na dobę.

1. Umyć i osuszyć ręce.
2. Umieścić niewielką ilość leku Mupina, mniej więcej wielkości główki zapalki, na małym palcu.
3. Wprowadzić ją do wnętrza jednego z nozdrzy.
4. Powtórzyć krok 2 i 3 do drugiego nozdrza.
5. Zaciśnąć skrzydełka nosa, aby rozprowadzić maść w nozdrzu.
6. Założyć zakrętkę na tubę i umyć ręce.

Zamiast małego palca do rozprowadzenia maści można użyć patyczka higienicznego, szczególnie u małych dzieci lub ciężko chorych osób.

### **Jak długo należy stosować lek Mupina**

Lek Mupina należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz. W razie wątpliwości należy się zwrócić do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty. Zwykle bakterie zostają usunięte z nosa w ciągu 5-7 dni od rozpoczęcia leczenia.

#### **Pożgnięcie leku Mupina**

W razie pożgnięcia jakiegokolwiek ilości maści należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

#### **Pominięcie zastosowania leku Mupina**

- Jeśli pacjent zapomni zastosować lek Mupina, należy go zastosować, gdy sobie o tym przypomni.
- Jeśli pora zastosowania kolejnej dawki wypada w ciągu godziny, należy opuścić pominiętą dawkę.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

#### **Przerwanie stosowania leku Mupina**

Jeśli zbyt wcześnie pacjent przerwie stosowanie leku Mupina, nie wszystkie bakterie mogą zginąć lub mogą się nadal namnażać. Należy zapytać lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, kiedy przerwać stosowanie maści.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

#### **Stany, na które należy zwrócić uwagę**

##### **Ciężkie reakcje skórne lub alergie:**

Są one bardzo rzadkie u osób stosujących lek Mupina. Objawy to:

- wypukła i swędząca wysypka
- obrzęk, czasem twarzy lub ust, powodujący trudności z oddychaniem
- omdlenie lub utrata przytomności.

➔ W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z tych objawów **należy się niezwłocznie skontaktować z lekarzem**. Przerwać stosowanie leku Mupina.

- Jeśli wystąpi ciężka reakcja skórna lub alergia należy:

- zmyć maść
- przerwać jej stosowanie oraz
- jak najszybciej poinformować lekarza.

W rzadkich przypadkach takie leki jak Mupina mogą powodować zapalenie okrężnicy (jelita grubego), prowadząc do biegunki, zazwyczaj z krwią i śluzem, bólu brzucha, gorączki (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy).

➔ W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z tych objawów **należy jak najszybciej powiadomić lekarza**.

Podczas stosowania tego leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

**Niezbyt często** (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- Świąd, zaczerwienienie, pieczenie, mrowienie lub kłucie w nosie.

**Bardzo rzadko** (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- U niektórych osób może wystąpić reakcja skórna lub alergia w ciężkiej postaci. Mogą wystąpić między innymi takie objawy jak: wysypka, świąd, zaczerwienienie lub bolesność.

#### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### **5. Jak przechowywać lek Mupina**

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie lub pudełku po: „Termin ważności (EXP)” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 7 dni.
- Lek Mupina ma postać gładkiej, białawej maści. Nie należy go stosować, jeśli wygląda inaczej niż zwykle.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

### **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

#### **Co zawiera lek Mupina**

- Substancją czynną leku jest mupirocyna w postaci mupirocyny wapniowej. 100 g maści do nosa zawiera 2,00 g mupirocyny w postaci mupirocyny wapniowej. 1 g maści do nosa zawiera 20 mg mupirocyny w postaci mupirocyny wapniowej.
- Pozostałe składniki to: wazelina biała i bis-diglicerolu poliacylodypinian-2.

#### **Jak wygląda lek Mupina i co zawiera opakowanie**

- Lek Mupina ma postać gładkiej, białawej maści do nosa.
- Lek Mupina jest dostępny w tubie zawierającej 3 g lub 5 g maści. Każda tuba jest zapakowana w pudełko tekturowe.

#### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH  
Von-Humboldt-Straße 1  
64646 Heppenheim

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

SOLPHARM Sp. z o.o.

ul. Zakątek 1

05-270 Marki

Tel.: + 48 22 616 28 08

**Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:**

|                  |  |
|------------------|--|
| Niemcy:          | Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g Nasensalbe  |
| Francja:         | MupiNa 2 %, pommade nasale                 |
| Grecja:          | MUPINA                                     |
| Włochy:          | PSEROCINA NASALE                           |
| Holandia:        | Mupirocine InfectoPharm, 20 mg/g, neuszalf |
| Austria:         | Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g Nasensalbe  |
| Polska:          | Mupina                                     |
| Portugalia:      | Mupirocina Infectopharm Nasal              |
| Słowacja:        | Mupina 20 mg/g nosová masť                 |
| Hiszpania:       | Bacnas 20 mg/g pomada nasal                |
| Czechy:          | Mupina                                     |
| Węgry:           | Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g orrkenőcs   |
| Wielka Brytania: | Mupirocin 20 mg/g Nasal Ointment           |

**Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.06.2023**